

kl 18.07

kl 22.05

kl 04.35

Tid för händelse

37- årig omfödarska föder sitt 3:e barn efter igångsättning p.g.a psykosociala skäl. Normal förlossning och ett barn med Apgar score 9- 9- 10.

1. Patienten anländer BB avdelningen. Mor och barn vålmående. Muntlig information angående BB tiden givses.

2. Patienten kommer utrusande i korridoren med barnet som hon hittat livlöst vid sin sida i sängen.

Barnet har enligt barnläkarjournal legat på mors bröst då hon sov. Klinikens skriftliga riktlinjer angående säker samsovning har ej följts.

Barnet återupplivas men avlider vid 1 dygns ålder.

Muntlig information som ges vid ankomst till BB är att barnet bör vara hud mot hud dygnets alla timmar oavsett vaken eller sovande förälder. Råden avviker från verksamhetens skriftliga rekommendationer som i sin tur avviker från Socialstyrelsens rekommendationer (angående plötslig spädbarnsdöd).

*Procedurer/ rutiner & riktlinjer*

I klinikens BB handbok finns riktlinjer för säker samsovning på BB

*Teknik, utrustning & apparatur*

Larmknapp för att snabbt tillkalla personal från annan enhet samt fullgod belysning saknas på BB- avdelningen.

Barnsäng bör finnas på alla BB rum.

Uppdatera och utarbeta rekommendationer i samråd med barnläkare så att muntlig och skriftlig information blir enhetlig.

Åtgärder vidtagna.