

Lördag 12:01

12:27

14:27

14:42

14:4X

Pat skrivs in med förvirring, hallucinationer, ostadig gång. Misstanke om etylöverkonsumtion

1. Ankommer till vårdlag, PAS tar över

2. PAS administrerar T Stesolid 2 x 5 mg (=10mg)

3. PAS administrerar Inj Stesolid 5 mg/ ml 2 ml (=10mg)  
**Felhändelse:**  
 1) Administration enligt ordination. Dock saknas rimlighetsbedömning  
 2) Läkaren ordinerar i mg i instruktioner men i ml i ordinationen

4. Pat "kollapsar" kort efter administrationen, team kommer in och börjar behandla patienten  
**Felhändelse:**  
 Initialt misstolkas det som anafylaxi, men inom kort identifieras orsaken, pat behandlas och kvicknar till

Pat skrivs ut till beroendekuten efter att ha försökt att avvika x flera

1) PAS är ny i sin yrkesroll

2) Oklart

Röda märken över sternum, misstolkades som anafylaxi istället för märken efter smärtstimulering

Utbildning & kompetens  
 Bakomliggande orsak

Åtgärdsförslag (Max 1000 tecken)

Åtgärdsförslag (Max 1000 tecken)

Utbildning & kompetens  
 PAS ej hunnit skaffa erfarenhet

Åtgärdsförslag: Deltagande i föreläsning/workshop för ssk ang läkemedel

Procedurer/ rutiner & riktlinjer  
 Läkaren har ej följt riktlinjer gällande administrering

Åtgärdsförslag: Information till samtliga läkare på kliniken gällande riktlinje

Utbildning & kompetens  
 Missuppfattning av akut situation

Inga åtgärdsförslag: Involverade har lärt sig av händelsen