

Svår fosterasfyxi hos fullgånge flicka.

KB8067120



35-årig frisk förstföderska med normal graviditet. Inkommer i fullgånge tid med värkar.

1. Normal Fosterljudskurva. Modermunnen öppen 9 cm.

2. Spontan vattenavgång med klart fostervatten.

3. Utebliven progress. **Värkförstärkande dropp kopplas på avvikande kurva utan att viktala läkare.**

4. Läkare bedömer CTG kurvan som avvikande. **CTG kurvan är patologisk. Laktat eller pH tas ej.**

5. Mekoniumfärgat fostervatten rinner. CTG signalerar med upprepade STAN-event. **Oxytocindroppet ökas succesivt trots progress.**

6. Tåta värkar, 6/10 min. **Fortsatt ökning av Oxytocindroppet med läkares godkännande.**

7. Barnmorskebyte. Förlossningsläkare med på rummet. CTG bedömd som patologisk. Förbereder för sugglocka.

8. Patologiskt CTG med upprepade STAN-event. Förberett för sugglocka. **Åtgärd avvaktas.**

Barnet framföds. Apgar: 1-4-4. PH navelartär 6,72. Vid 1 månads ålder fortsatt inskriven på barnavdelning med anledning av bestående svåra hjärnskador. Avlider vid 2 månaders ålder.

Pat har varit fullvidgad och krystat i 2 timmar.

Svårtolkad CTG kurva

CTG för stunden normalt.

Patienten krystar, huvudet skymtar vid värk.

Bedömer att förlossning är nära förestående

Ingen ytterligare läkare som bedömer CTG.

Kommunikation & information
Utebliven time out.

Procedurer/ rutiner & riktlinjer
Ej följt befintligt PM för värksvagheter.

Utbildning & kompetens
PM för fosterövervakning har ej följts. Enl PM föreslås frikostig provtagning av pH/laktat vid svårtolkat CTG.

Omgivning & organisation
Läkare arbetar ensam under jourtid med möjlighet att konsultera andra jourer.

Procedurer/ rutiner & riktlinjer
Felhändelser trots tydligt PM

Åtgärdsförslag.
Följa rutin för Time out samt dokumentera plan.

Åtgärdsförslag
Medvetandegöra klinikens PM.

Åtgärdsförslag
Återkommande fallgenomgångar. Kontinuerlig CTG certifiering

Åtgärdsförslag
Utökad samarbete mellan sjukhusens jourer vid svårtolkat CTG.

Åtgärdsförslag
Omstrukturering i gällande PM angående värksvagheter och rutiner för Oxytocin-användning.