

Dag 0

Dag 1

Dag 8

Dag 11

Dag 18

Förtidigt födda barn vårdades på gemensam övervakningssal

1. Rutinmässig provtagning (screening) för ESBL
4 patienter har ESBL smitta. De vårdas nu på enskilda föräldrarum

2. Screening på barn nr 5 som vårdas på föräldrarum
Positiv ESBL odlingssvar på barn nr 5 som tidigare varit negativ på odlingen

3. Screening på barn nr 6 som vårdas på föräldrarum
Positiv ESBL odlingssvar på barn nr 6 som tidigare varit negativ på odlingen

Alla Patienterna är utskrivna till hemmet eller på hempermission

Patient har utsatts för risk för smitta

Patient har utsatts för smitta

Risker finns vid tillredning av mat på helger/ kvällen

Svårt att efterleva kohortvård

Trångt på salen 3- 4 pat vårdas på sal avsedd för 2 pat

Personalen har ibland ingen skyddsklädsel eller gula rockar på när de sköter barnen

Risk för ihopblaning av utrustning

Bröstpump ej patientbunden

Det har förekommit att personalen tar upp barnen i famnen för att trösta utan att använda skyddsförkläden

Patienter har undersökts på teamstation istället för på sin egen plats

Patienter har förflyttades på avd till teamstationen och ute i korridoren trots smitta

Svårighet med information till icke svensktalande föräldrar

Risk för smittspridning från föräldrar

För lite personal gör att man vårdar flera barn, man hjälper varandra med rastavlösning

Överbeläggning på avdelningen

Patientbundna stetoskop, temp, klocka är ej tillräckligt ID märkta

Föräldrarum saknar egen toalett.

Föräldrar har mat i samma kylskåp

Omgivning & organisation
Bakomliggande orsak: Pga personalbrist kan man ibland bara ha öppet ett övervaknings rum istället för två

Procedurer/ rutiner & riktlinjer
Bakomliggande orsak: Bristande följsamhet av hygien rutiner/ riktlinjer

Utbildning & kompetens
Bakomliggande orsak: Rutiner/ riktlinjer inte tillräckligt kommunicerade och kända på avdelningen. Det är många nyanställd personal på avdelningen

Procedurer/ rutiner & riktlinjer
Bakomliggande orsak: Patienterna har ingen egen hurs. Bröstmjölkskumpen används av flera mammor, pumpen är ej personbunden

Omgivning & organisation
Bakomliggande orsak: Risk finns att smitta sprids när mat bereds då det endast finns avsatt personal till detta mån- fre dagtid

Procedurer/ rutiner & riktlinjer
Bakomliggande orsak: Bristande följsamhet av hygien rutiner/ riktlinjer

Kommunikation & information
Bakomliggande orsak: Tolkhjälp används mest till läkarsamtal, det finns inte möjlighet att boka dem för att kunna informera om allt

Omgivning & organisation
Föräldrarum är ej anpassade för patienter med smitta då endast ett rum har egen toalett. Föräldrarna har gemensamt kylskåp

Atgärdsförslag:
Bemanning för att kunna avdela personal till barn som behöver övervakas

Atgärdsförslag:
Uppmärksamma hygienrutiner

Atgärdsförslag:
Utbilda personal om hur man hittar PM i Barium

Atgärdsförslag:
Anskaffning av fler bröstpumpar och patient bundna hursar. Checklista för patientnära smittrening/ städning dagligen samt slutstädning för vårdpersonal och lokalvårdare

Atgärdsförslag:
Ha avdelad personal i mjölkköket alla dagar i veckan

Atgärdsförslag:
Uppmärksamma hygienrutiner

Atgärdsförslag:
Broschyr till föräldrarna översatt på fler språk om hygienrutiner på neonatalavdelning

Atgärdsförslag:
Nybyggnation är under planering med möjlighet till patientbundna toaletter samt kylskåp